



Anализar el tratamiento con su médico



No es un paciente real.

¿Qué es TALZENNA?

TALZENNA es un medicamento de venta con receta que se utiliza en combinación con un medicamento llamado enzalutamida para tratar a adultos con cáncer de próstata

- con ciertos genes anormales heredados o adquiridos llamados genes de reparación por recombinación homóloga (genes HRR), por sus siglas en inglés **y**
- que ya no responde a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona, y que se ha extendido a otras partes del cuerpo (metastásico).

Su proveedor de atención médica le realizará una prueba para asegurarse de que TALZENNA es adecuado para usted.

Se desconoce si TALZENNA es seguro y eficaz en niños

Preguntas para su próxima consulta

He aquí algunas preguntas con las que puede empezar para ayudarles a usted y a su médico a decidir si TALZENNA + XTANDI es el tratamiento adecuado para usted.

- ¿Qué es el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm) con mutación genética HRR?
- ¿Cómo puedo conocer mi estado de HRR y por qué es importante?
- ¿Cuáles son los resultados de los ensayos clínicos y cómo pueden ayudarme a decidir si TALZENNA + XTANDI es el tratamiento adecuado para mí?
- ¿Cómo debo tomar TALZENNA + XTANDI?
- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios y cómo puede ayudarme a controlarlos?
- ¿Lo recojo en la farmacia o me lo envían por correo?
- ¿Hay algún recurso que pueda ayudar con el acceso y/o el apoyo financiero?

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

TALZENNA puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

Problemas de médula ósea denominados síndrome mielodisplásico (SMD) o leucemia mieloide aguda (LMA). Algunas personas que tienen cáncer y que han recibido tratamiento previo con quimioterapia o algunos otros medicamentos para su cáncer han desarrollado SMD o LMA durante o después del tratamiento con TALZENNA. El SMD o la LMA pueden provocar la muerte. Si desarrolla SMD o LMA, su proveedor de atención médica interrumpirá el tratamiento con TALZENNA.

Consulte la información de seguridad importante adicional en la página siguiente. Haga clic para obtener la [información completa para el paciente](#) de TALZENNA o visite TALZENNA+XTANDI.com. Hable con su médico o consulte la Información para el paciente de XTANDI para obtener información importante sobre la seguridad de XTANDI.

ESCANEE AQUÍ
para obtener
información sobre
el apoyo para
TALZENNA.



Pfizer Oncology together™
PARA OBTENER ASISTENCIA
PERSONALIZADA EN VIVO de
Pfizer Oncology Together™
LLAME AL 1-877-744-5675 (de
lunes a viernes de 8 a. m. a 8
p. m., hora del Este) O visite
PfizerOncologyTogether.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

TALZENNA puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

Problemas de médula ósea como el síndrome mielodisplásico (SMD) o leucemia mieloide aguda (LMA).

Algunas personas que tienen cáncer y que han recibido tratamiento previo con quimioterapia o algunos otros medicamentos para su cáncer han desarrollado SMD o LMA durante o después del tratamiento con TALZENNA. El SMD o la LMA pueden provocar la muerte. Si desarrolla SMD o LMA, su proveedor de atención médica interrumpirá el tratamiento con TALZENNA.

Si bien los recuentos bajos de células sanguíneas son síntomas frecuentes durante el tratamiento con TALZENNA, también pueden ser un signo de problemas graves, como el SMD o la LMA. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con TALZENNA:

- debilidad
- pérdida de peso
- fiebre
- infecciones frecuentes
- presencia de sangre en la orina o las heces
- dificultad para respirar
- cansancio
- aparición de moretones o tendencia a sangrar con más facilidad

Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para comprobar el recuento de células sanguíneas:

- antes de iniciar el tratamiento con TALZENNA
- todas las semanas si tiene un recuento bajo de células sanguíneas que se prolonga por mucho tiempo

TALZENNA puede causar problemas de fertilidad en los varones. Esto puede afectar su capacidad para engendrar un hijo. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TALZENNA. Llame a su médico para que le informe sobre los efectos secundarios.

**Lo animamos a que informe a la FDA los efectos secundarios de los medicamentos recetados.
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.**

Haga clic para ver la [Información completa para el paciente](#) de TALZENNA o visite TALZENNAXTANDI.com. Hable con su médico o consulte la [Información para el paciente](#) de XTANDI para obtener información importante sobre la seguridad de XTANDI.

Su proveedor de atención médica puede modificar la dosis, interrumpir temporalmente o interrumpir definitivamente el tratamiento con TALZENNA si experimenta ciertos efectos secundarios.

Antes de tomar TALZENNA, informe a su proveedor de atención médica todas sus afecciones de salud, incluso si:

- Tiene problemas de riñón
- Está embarazada o tiene planeado quedar embarazada. TALZENNA puede dañar al bebé en gestación y puede causar la pérdida del embarazo (aborted espontáneo). No debe quedar embarazada durante el tratamiento con TALZENNA.
- Los varones con pareja femenina embarazada o que pueda quedar embarazada deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con TALZENNA y durante los 4 meses siguientes a la última dosis de TALZENNA.
- Está amamantando o tiene previsto hacerlo. Se desconoce si TALZENNA pasa a la leche materna.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los de venta con y sin receta médica, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Tomar TALZENNA con algunos otros medicamentos puede afectar la forma en que TALZENNA actúa y puede causar efectos secundarios.

Conozca los medicamentos que toma. Lleve una lista de sus medicamentos y muéstresela a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico cuando adquiera un nuevo medicamento.

Cómo tomar TALZENNA

- Tome TALZENNA exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.

- No cambie la dosis de TALZENNA ni deje de tomarlo sin consultar antes con su profesional de la salud.
- Debe iniciar o continuar un tratamiento con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) durante su tratamiento con TALZENNA y enzalutamida, a menos que se haya sometido a una intervención quirúrgica para reducir la cantidad de testosterona en su organismo (castración quirúrgica).
- Si no puede tomar u olvida una dosis de TALZENNA, tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis adicional para compensar una dosis olvidada.

Los efectos secundarios más frecuentes de TALZENNA cuando se toma en combinación con enzalutamida incluyen:

- disminución del recuento de eritrocitos (glóbulos rojos)
- disminución del recuento de leucocitos (glóbulos blancos)
- cansancio o debilidad
- disminución del recuento de trombocitos (plaquetas)
- disminución del calcio en sangre
- náuseas
- disminución del apetito
- disminución del sodio en sangre
- disminución del fosfato en sangre
- lesiones óseas
- disminución del magnesio en sangre
- mareos
- aumento de la bilirrubina en sangre
- estreñimiento
- cambios en el sentido del gusto