

  
**TALZENNA**<sup>®</sup> +  
talazoparib 0.5mg  
capsúles

  
**Xtandi**<sup>®</sup>  
(enzalutamide)  
40 mg tablets | 80 mg tablets



## HABLANDO DEL TRATAMIENTO CON SU MÉDICO

### ¿QUÉ ES TALZENNA + XTANDI?

TALZENNA es un medicamento de venta con receta que se utiliza en combinación con un medicamento llamado enzalutamida, para tratar a adultos con cáncer de próstata

- + con algunos genes anómalos innatos o adquiridos, denominados genes de reparación por recombinación homóloga (HRR, por sus siglas en inglés) y
- + que ya no responde a un tratamiento hormonal o quirúrgico para reducir la testosterona y se ha extendido a otras partes del cuerpo ( metástasis).

Su proveedor de atención médica le realizará una prueba para asegurarse de que TALZENNA es adecuado para usted. En la actualidad se desconoce si TALZENNA es seguro y eficaz en niños.

### PREGUNTAS PARA SU PRÓXIMA CONSULTA

A continuación encontrará algunas preguntas con las que puede comenzar para que usted y su médico decidan si TALZENNA + XTANDI es el tratamiento adecuado para usted.

- > ¿En qué consiste el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración metastásico (CPRCm) con mutación de los genes HRR?
- > ¿Cómo puedo conocer mi estado de HRR y por qué es importante?
- > ¿Cuáles son los resultados de los ensayos clínicos y cómo pueden ayudarme a decidir si TALZENNA + XTANDI es el tratamiento adecuado para mí?
- > ¿Cómo tengo que tomar TALZENNA + XTANDI?
- > ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios y cómo pueden ayudarme a controlarlos?
- > ¿Lo voy a buscar a la farmacia o me lo envían por correo?
- > ¿Hay algún tipo de servicio que pueda facilitar el acceso o proporcionar alguna ayuda económica?

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

TALZENNA puede causar efectos secundarios graves, por ejemplo:

**Problemas de médula ósea como el síndrome mielodisplásico (SMD) o la leucemia mielógena aguda (LMA).**

Algunas personas que padecen cáncer y que han recibido tratamiento previo con quimioterapia u otros medicamentos para el cáncer han desarrollado SMD o LMA durante el tratamiento con TALZENNA o después de este. El SMD o la LMA pueden causar la muerte. Si desarrolla el SMD o la LMA, su proveedor de atención médica interrumpirá el tratamiento con TALZENNA.

Consulte la información complementaria sobre la seguridad en la página siguiente. Haga clic para ver el [folleto detallado para el paciente](#) sobre TALZENNA o visite [TALZENNAXTANDI.com](http://TALZENNAXTANDI.com). Hable con su médico o consulte el folleto para el paciente sobre XTANDI para obtener información de seguridad importante respecto a este medicamento.

HAGA CLIC AQUÍ  
PARA OBTENER  
SOBRE APOYO  
DISPONIBLE

Pfizer Oncology together™

PARA RECIBIR ASISTENCIA  
PERSONALIZADA EN DIRECTO,  
LLAME AL 1-877-744-5675  
DE LUNES A VIERNES,  
DE 8 AM A 8 PM (HORA DEL ESTE)  
O VISITE [PfizerOncologyTogether.com](http://PfizerOncologyTogether.com)

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

**TALZENNA puede causar efectos secundarios graves, por ejemplo: Problemas de médula ósea como el síndrome mielodisplásico (SMD) o la leucemia mieloide aguda (LMA).**

Algunas personas que padecen cáncer y que han recibido tratamiento previo con quimioterapia u otros medicamentos para el cáncer han presentado SMD o LMA durante el tratamiento con TALZENNA o después de este. El SMD o la LMA pueden causar la muerte. Si presenta SMD o LMA, el médico interrumpirá el tratamiento con TALZENNA.

Los síntomas de valores bajos en el hemograma son comunes durante el tratamiento con TALZENNA, pero pueden ser indicativos de problemas graves, como el SMD o la LMA. Comuníquese a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con TALZENNA:

- + debilidad
- + disminución de peso
- + fiebre
- + infecciones frecuentes
- + sangre en orina o heces
- + dificultad para respirar
- + sensación de agotamiento
- + hematomas o sangrado con mayor facilidad

El médico le hará análisis de sangre para comprobar los valores de su hemograma:

- + cada mes durante el tratamiento con TALZENNA
- + cada semana si tiene valores bajos en el hemograma que se mantienen durante mucho tiempo. Su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con TALZENNA hasta que mejoren los valores de su hemograma.

TALZENNA puede afectar a la fertilidad masculina. Este problema puede repercutir en su capacidad para engendrar un hijo. Hable con su proveedor de atención médica si este tema le preocupa.

Los ejemplos anteriores son algunos de los posibles efectos secundarios de TALZENNA. Llame a su médico para que le informe acerca de los efectos secundarios.

**Le recomendamos que notifique los efectos secundarios de los medicamentos recetados a la FDA. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.**

**Haga clic para ver el [folleto detallado para el paciente](#) sobre TALZENNA o visite [TALZENNAXTANDI.com](http://TALZENNAXTANDI.com).**

**Hable con su médico o consulte el folleto para el paciente sobre XTANDI para obtener información de seguridad importante respecto a este medicamento.**

**Antes de tomar TALZENNA, comuníquese a su proveedor de atención médica todas las enfermedades que padece, incluso si:**

- + tiene problemas renales
- + está embarazada o tiene intención de quedarse embarazada. TALZENNA puede dañar al feto y provocar la interrupción del embarazo (aborto espontáneo). No debe quedarse embarazada durante el tratamiento con TALZENNA. Avise inmediatamente a su proveedor de atención médica si está embarazada o se queda embarazada durante el tratamiento con TALZENNA.
  - > Los varones con parejas femeninas embarazadas o que puedan quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con TALZENNA y al menos hasta 4 meses después de recibir la última dosis de este medicamento.
- + está amamantando o tiene intención de hacerlo. Se desconoce si TALZENNA pasa a la leche materna.

**Comuníquese su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta, los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de plantas medicinales. Tomar TALZENNA y otros medicamentos puede afectar al funcionamiento de TALZENNA y provocar efectos secundarios.**

Infórmese sobre los medicamentos que toma. Anote los medicamentos que toma y muéstreselos al médico y al farmacéutico cuando vaya a tomar uno nuevo.

### Cómo tomar TALZENNA

- + Tome TALZENNA exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.
- + No cambie la dosis ni deje de tomar TALZENNA sin consultar antes con el médico.

- + Debe empezar o continuar un tratamiento con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) durante el tratamiento con TALZENNA y enzalutamida, a menos que le hayan realizado una intervención quirúrgica para reducir la cantidad de testosterona del organismo (castración quirúrgica).
- + Si olvida una dosis de TALZENNA o vomita, tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis de más para compensar la dosis que haya olvidado.
- + Si toma una cantidad excesiva de TALZENNA, llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente al servicio de urgencias del hospital más cercano.

**Los efectos secundarios más frecuentes de TALZENNA cuando se toma en combinación con enzalutamida son los siguientes:**

- + cifra baja de glóbulos rojos
- + cifra baja de glóbulos blancos
- + cansancio o debilidad
- + cifra baja de plaquetas
- + concentración baja de calcio en la sangre
- + náuseas
- + disminución del apetito
- + concentración baja de sodio en la sangre
- + concentración baja de fosfato en la sangre
- + lesiones óseas
- + concentración baja de magnesio en la sangre
- + mareo
- + aumento de la bilirrubina en la sangre
- + concentración baja de potasio en la sangre
- + cambios en el sentido del gusto

### Pfizer – Certificate of Translation

I, Eva Zrihem, Transcreation Director at translate plus, declare under penalty of perjury that our linguist, scientific and biomedical translator, fluent in English and Spanish, and to the best of their knowledge and belief, have provided an accurate translation of the English reference source document provided into Spanish.

Source document name	Translated document name	Source language	Target language
PP-TXT-USA-0029: US Branded HRR TALA Digital Single Page Discussion Guide	PP-TXT-USA-0231: Talzenna + Xtandi Spanish Language HRR Doctor Discussion Guide	English	Spanish

Translations may not always be verbatim to account for nuances and geographical idioms, however, it remains consistent with the intent of the original piece.

The translation of the attached document is hereby certified, no judgment whatsoever is made concerning the contents thereof.

Date: 25 January 2024

Signed: *Eva Zrihem*